


Kennelhoste



Kennelhoste

Kennelhoste er en meget smitsom og generende infektion i hundens luftveje. Sygdommen forekommer overalt i verden, og navnet "kennelhoste" henviser til, at smitten især flourer, hvor der er mange hunde samlet.



Smitstof

Kennelhoste forårsages af et eller flere smitstoffer i kombination. De hyppigste smitstoffer ved kennelhoste er en influenzavirus (hundens parainfluenza) og en bakterie (*Bordetella bronchiseptica*). Andre virus og bakterietyper kan også spille en rolle ved nogle kennelhostetilfælde.

Efter smitte med *B. bronchiseptica* vil hunden få sygdomstegn (hoste og evt. løbende næse og øjne) efter 3-4 dage. Hvis ikke infektionen med *B. bronchiseptica* kompliceres af andre smitstoffer, vil hunden have sygdomstegn i ca. 10 dage. Herefter udskiller den dog fortsat smitstof til omgivelserne i 6-14 uger.

En ukompliceret parainfluenza-infektion giver ofte mild hoste og evt. lidt klart næseflåd.

Parainfluenzavirus og *B. bronchiseptica* optræder ofte i kombination og forårsager kraftigere sygdomstegn, der kan strække sig over flere uger.

Smitte

Kennelhoste smitter ved luftbåren spredning af små dråber med smitstoffet i. Desuden kan smitten overføres via foderskåle, legetøj, pinde og tøj. Hundene behøver altså ikke være i direkte kontakt med hinanden for at overføre smitten, men dårlig ventilation og mange hunde på mindre plads vil øge smittepresset og dermed risikoen for at blive syg.

Sygdomstegn

Kennelhoste er en betændelsestilstand i hundens øvre luftveje med rødme og hævelse af hals og svælg. Ofte høres en skurrende tør hoste, men der kan også hostes slim eller skum op. I nogle tilfælde ender hosteanfaldene med opkastninger. Nogle hunde med kennelhoste nyser også, og der ses flåd fra næse og øjne. Dette kan være klart og vandigt, men kan udvikle sig til gult eller grønligt snot i nogle tilfælde. Nogle hunde har let feber i starten af forløbet. I få tilfælde mister hunden ædelysten og får længerevarende feber. I sjældne tilfælde kompliceres lidelsen af lungebetændelse.

Kontakt din dyrlæge hvis hunden hoster, har høj eller langvarig feber, udvikler vejrtrækningsproblemer eller mister ædelysten.

Behandling

De lette tilfælde af kennelhoste er selvbegrænsende, og hunden kommer sig i løbet af 1-2 uger uden behandling. Kontakt dog altid dyrlægen for at få stillet den korrekte diagnose, da hunden kan hoste af mange andre årsager end kennelhoste. I nogle tilfælde af kennelhoste får hunden brug for dyrlægebehandling pga. mere alvorlige infektioner.



Vaccination og forebyggelse

Ved vaccination af hunden kan man beskytte både den enkelte og andre hunde i omgivelserne mod smitte. Hunden kan vaccineres mod både parainfluenza og *B. bronchiseptica* med en ny type vaccine, som dryppes i hundens ene næsebor.

Ved at vaccinere hunden før den skal i pension eller på udstilling, vil man ikke blot beskytte den enkelte hund mod kennelhoste, men også nedsætte mængden af smitstof som hunden kan bære med sig og smitte videre med. Ud over vaccination er det vigtigt at sikre god ventilation og hygiejne hvor mange hunde er samlet for at nedsætte smittepresset.

I kenneler, hundepensioner og internater kan smitte med kennelhoste nedsættes markant, hvis alle hunde er vaccineret mod *B. bronchiseptica* og parainfluenzavirus inden de ankommer.

Efter vaccination med et dryp i næsen er hunden beskyttet mod infektion med *B. bronchiseptica* allerede efter 72 timer. Beskyttelse mod parainfluenza opnås efter 3 uger. Hunden er beskyttet mod begge smitstoffer i et år efter vaccination.





Nonoprimo 5/18/2019 10:45:00 AM



RESEARCH • PERFORMANCE • INTEGRITY